



**Ентеросорбент.
Для виведення токсинів, алергенів та патогенних бактерій**

Добавка дієтична «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ® таблетки»

Склад:

1 таблетка містить: *основна речовина*: кремнію діоксид колоїдний безводний (210 мг/мг); *допоміжні речовини*: целюлоза мікрокристалічна, сорбіт (Е 420), натрію кроскармелоза, крохмаль картопляний, магнію стеарат.

Кремнію діоксид — високодисперсна речовина (з малими розмірами часточок), властивості якої забезпечують сорбцію (захоплення) речовин білкової природи. Це сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного або іншого походження.

Завдяки особливостям будови мікроорганізмів високодисперсний кремнію діоксид активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 10^{10} мікробних тіл на 1 грам речовини, що дозволяє полегшити прояви харчового отруєння та скоротити перебіг гострої діареї.

Крім того частинки кремнію діоксиду обволікують слизову оболонку кишечника, це перешкоджає адгезії (закріпленню) мікроорганізмів та їхньому зростанню, а також обмежує секрецію рідини в кишечнику.

Відсутність пор у часточок кремнію діоксиду пояснює слабку сорбцію низькомолекулярних сполук, зокрема мінеральних речовин і вітамінів.

Кремнію діоксид сприяє переміщенню з внутрішнього середовища організму до травного тракту різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, олігопептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів з подальшим зв'язуванням і виведенням з організму.

Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладається в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, а структура його часток не змінюється при зміні рН.

Рекомендації щодо застосування:

«Біле Вугілля®» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело ентеросорбентів з метою:

- зниження наслідків вживання неякісної їжі та алкоголю, інтоксикації побутовими і промисловими токсинами та для відновлення нормальної діяльності шлунково-кишкового тракту та інших систем організму, порушеної дією патогенних мікроорганізмів, харчових та бактеріальних алергенів. Таке зниження відбувається шляхом адсорбції і виведення з шлунково-кишкового тракту екзо- та ендогенних токсинів різного походження, алергенів та мікробних тіл, алкалоїдів, солей важких металів. Прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» сприяє скороченню перебігу гострої діареї у дорослих;
- опосередкованого зниження метаболічного навантаження на печінку та нирки, корекції обмінних процесів і імунного статусу, усунення дисбалансу біологічно активних речовин в організмі. Тому прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» рекомендований з метою сприяння детоксикаційним процесам в організмі, для полегшення перебігу дерматитів та алергічних станів.

При дотриманні способу застосування прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» не викликає закріпів.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

Вживати у проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою:

- дорослим та дітям віком від 7 років і старше – по 3-5 таблеток 3-4 рази на добу;
- дітям віком 5-6 років – по 3 таблетки 3 рази на добу;
- дітям віком 3-4 роки – по 2 таблетки 3 рази на добу.

Курс споживання визначає лікар індивідуально.

Особливості застосування:

- Вживати не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі.
Подрібнення таблеток не є обов'язковим.
- У випадку необхідності прийому пероральних лікарських засобів, дієтичну добавку «Біле Вугілля®» слід вживати за 1 годину до прийому таких засобів.

Застереження:

- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
- Ця дієтична добавка не містить цукру, тому її можна застосовувати при наявності цукрового діабету.
- Ця дієтична добавка містить сорбіт, тому її не слід застосовувати при синдромі непереносимості фруктози.

Протипоказання:

- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у стадії загострення.
- Виразки та ерозії слизової оболонки кишечника.
- Шлункові та кишкові кровотечі.
- Кишкова непрохідність.

Форми випуску:

По 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній пацці.

По 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній пацці.

Маса нетто 1 таблетки: 700 мг (мг) ± 7,5%.

Строк придатності: 3 роки.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, вологи та недоступному для дітей місці за температури не вище 30°C.

Виробник:

ТОВ «АКТИФАРМ»,
Україна, 02141, м. Київ, вул. О.Мишуги, буд. 10, офіс 212,
тел. +38 (044) 377 51 14;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17.

ТУ У 10.8-38526527-002:2022