

РАЙТ

Антиоксидантний захист
при метаболічних розладах

Добавка дієтична «**Райт**»

Склад: *1 капсула містить: основна речовина:* натрієва сіль R(+)-енантіомеру альфа-ліпоєвої (тіоктової) кислоти – 375 mg (мг) (що еквівалентно 300 mg (мг) R(+)-енантіомеру альфа-ліпоєвої кислоти); *допоміжні речовини:* целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид, кальцію стеарат, лактоза.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)
на 100 g (г): білки – 0 g (г), жири – 0,9 g (г), вуглеводи – 1,5 g (г); 1187 kJ (кДж)/ 296 kcal (ккал)*;
на 1 капсулу: білки – 0 g (г) , жири – 0,004 g (г), вуглеводи – 0,01 g (г); 4,63 kJ (кДж) / 1,15 kcal (ккал)*;
*при розрахунку енергетичної цінності враховано вміст органічних кислот.

Альфа-ліпоєва кислота (АЛК) – це вітаміноподібна речовина. В організмі АЛК присутня у вигляді R-енантіомеру (фармакологічно активної форми АЛК) і виступає в ролі природного коферменту для мітохондріальних ферментів при окислювальному декарбоксилюванні α-кетокислот і синтезі ацетил-коензиму А. Тому прийом АЛК сприяє покращенню вуглеводного і ліпідного обміну, усуненню метаболічного ацидозу, нормалізації функціонування печінки, має детоксикаційні та м'які жовчогінні властивості .
АЛК є водо- та жиророзчинним антиоксидантом, тому проявляє захисну дію у клітинній мембрані і внутрішньоклітинно. АЛК здатна прямо чи опосередковано відновлювати інші антиоксиданти: вітамін С і вітамін Е, глутатіон. Крім того, АЛК збільшує рівні глутатіону і коензиму Q10 в організмі.
АЛК є хелатором (зв'язувачем) металів, тому запобігає утворенню вільних радикалів під дією деяких металів на організм.
Порушення роботи антиоксидантної системи (в тому числі і оксидативний стрес) відбувається при:

- метаболічних розладах: метаболічний синдром і цукровий діабет;
- порушеннях роботи органів травної системи: гепатит, панкреатит тощо;
- порушеннях роботи серцево-судинної системи: ішемічна хвороба серця, атеросклероз, інфаркт міокарду;
- нейродегенеративних захворюваннях: хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, хвороба Гантінгтона, депресія та розсіяний склероз;
- синдромі хронічної втоми.

Рекомендації щодо споживання:
РАЙТ рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело альфа-ліпоєвої кислоти при станах, пов'язаних із оксидативним стресом та порушеннями роботи антиоксидантної системи.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
вживати дорослим по 1 капсулі на добу натще, за 30 хв до першого прийому їжі, запиваючи питною водою. Мінімальна тривалість курсу споживання – 2 місяці. При необхідності курс споживання можна повторити.

За призначенням лікаря добова доза і курс споживання можуть бути змінені. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо споживання:

- Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- Одночасний прийом їжі утруднює всмоктування АЛК, тому важливо вживати добавку дієтичну до першого прийому їжі.
- Дієтична добавка РАЙТ містить лактозу, тому її не слід застосовувати при непереносимості галактози, недостатності лактази або синдромі недостатності всмоктування глюкози-галактози.
- При наявності жовчнокам'яної хвороби слід отримати консультацію лікаря перед прийомом.
- Ознаками індивідуальної непереносимості є можливі зміна або порушення смакових відчуттів, нудота, блювання, біль у животі, діарея. Такі реакції усуваються припиненням прийому дієтичної добавки.
- Ефективність цисплатину знижується при одночасному застосуванні із АЛК.
- АЛК є хелатором металу, і тому її не слід застосовувати одночасно зі сполуками металів (наприклад, з харчовими добавками, що містять залізо, магній), або з молочними продуктами, оскільки вони містять кальцій.
- Якщо загальну добову дозу дієтичної добавки РАЙТ застосовувати за 30 хвилин до сніданку, тоді харчові добавки, що містять залізо, магній, кальцій, можна приймати вдень або ввечері.
- Прийом добавки може посилити глюкозознижувальну дію інсуліну або пероральних протидіабетичних засобів, тому, особливо на початковій стадії вживання АЛК, показаний ретельний контроль рівня глюкози в крові.
- Для уникнення симптомів гіпоглікемії в окремих випадках може виникнути необхідність у зниженні дози інсуліну або перорального протидіабетичного засобу.
- Капсули добавки дієтичної РАЙТ мають специфічний запах, властивий основній речовині.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації.

Форма випуску:
капсули №30 і/або №60 у полімерних контейнерах, упакованих в картонну пачку.
Маса нетто 1 капсули: 390 mg (мг) ± 10%.
Строк придатності: 2 роки.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за температури не вище 25°С.

Виробник: ТОВ "АКТІФАРМ".
Україна, 02068, м.Київ, вул. Ахматової, буд.45, к.30; тел.: +38 044 377-51-14 (-15;-16).
фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:
Україна, 20741, Черкаська обл., Смілянський район, с. Сунки, вул. Центральна, 1.

ТУ У 10.8 –38526527-001:2018